

提防中藥烏頭類生物鹼中毒

衛生署近日接獲一宗由醫院管理局呈報的有關烏頭類生物鹼中毒的確診個案。該個案病人曾獲上水一註冊中醫師處方製附子。病人接受治療後已康復出院。化驗分析顯示該病人尿液檢測結果含有烏頭類生物鹼，是次中毒個案懷疑與服用過量的製附子有關。

製附子是含烏頭類生物鹼的中藥材，可治療寒證，須經長時間的煎煮以降低毒性後方可服用。如不適當地使用，烏頭類生物鹼可引致口部及四肢麻痺、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏微弱、呼吸困難等，嚴重者可導致死亡。

衛生署提醒中醫師在處方中藥時應參照有關的中藥材標準。中醫師在處方毒性中藥材時要特別謹慎，用量、配伍及煎服方法等要根據臨床情況及有所依據。市民亦必須遵從中醫師的指示煎煮及服用中藥材。市民如在服用中藥材後感到不適，應盡快求醫。

衛生署會將此個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進該中醫師是否涉及不恰當執業。

有關安全使用含烏頭類生物鹼的中藥材，可參閱衛生署網頁
(http://www.cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet/The_safe_use_of_Chinese_medicines_containing_aconitum_alkaloids.html)。

衛生署中醫藥事務部

2014年8月25日