

提防中藥中毒

衛生署近日接獲由醫院管理局（醫管局）呈報一宗有關烏頭類生物鹼中毒的確診個案。病人曾向中醫師求診，並獲處方兩劑中藥材，惟未有遵從中醫師的建議方法煎煮中藥材。病人服藥後出現暈眩、面部麻痺及作嘔的徵狀，其後入住公立醫院接受治療，現已出院。醫管局的化驗結果顯示，病人的尿液樣本含有烏頭類生物鹼。現場調查並未發現相關中藥受烏頭類生物鹼污染，是次中毒個案懷疑與未有遵從中醫師建議的煎煮方法及服用煎煮不足的製附子有關。

製附子屬於《中醫藥條例》（第549章）附表2中藥材，一般用於治療痛症，含有烏頭類生物鹼。如不適當地使用，烏頭類生物鹼可引致唇周和四肢麻痺、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏微弱及呼吸困難，嚴重者可導致死亡。因此，製附子須經長時間的煎煮以降低毒性方可服用。

衛生署呼籲市民，如有不適向中醫求診，應按中醫師指示服用中藥。如在服藥後感到不適，應盡快求醫。

市民可瀏覽衛生署中醫藥事務部網頁 (http://cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html)，參閱更多有關安全使用中藥資訊。

衛生署中醫藥事務部

2017年1月6日