

提防中藥中毒

衛生署近日接獲由醫院管理局（醫管局）呈報一宗有關烏頭類生物鹼中毒的確診個案。病人在沒有向中醫師求診的情況下，自行於持牌中藥材零售商購買中藥及煎煮服用。病人服用藥湯後出現噁心、心悸和四肢麻痺的徵狀，其後入住公立醫院接受治療，現已出院。醫管局的化驗結果顯示，病人的藥湯及尿液樣本含有烏頭類生物鹼。現場調查並未發現相關中藥受烏頭類生物鹼污染，是次中毒個案懷疑與未經中醫師指導下自行服用中藥和使用過量及煎煮不足的製附子有關。

製附子屬於《中醫藥條例》（第 549 章）附表 2 中藥材，一般用於治療痛症，含有烏頭類生物鹼。如不適當地使用，烏頭類生物鹼可引致唇周和四肢麻痺、頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉、脈搏微弱及呼吸困難，嚴重者可導致死亡。因此，製附子須經長時間的煎煮以降低毒性方可服用。

衛生署提醒市民不應妄自處方中藥；如有不適，應先向中醫師求診才服用中藥。如在服藥後感到不適，應盡快求醫。

市民可瀏覽衛生署中醫藥事務部網頁 (http://cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html)，參閱更多有關安全使用中藥資訊。

衛生署中醫藥事務部
2017 年 2 月 6 日