

## 提防中药中毒

卫生署近日接获由医院管理局（医管局）呈报一宗有关乌头类生物碱中毒的确诊个案。事件涉及一名三十二岁病人，因服用家人为其煎煮含中药材制附子的药汤后，出现麻痹、晕眩、腹痛和腹泻的症状，需入住公立医院接受治疗，其后出院。病人的尿液样本经医管局化验后，证实含有乌头类生物碱。是次中毒个案怀疑与病人未经中医师指导下自行服用中药材及中药材煎煮不足有关。

制附子属于《中医药条例》（第549章）附表2内中药材，一般用于治疗痛症。其含有乌头类生物碱，如不适当地使用，可引致唇周和四肢麻痹、晕眩、恶心、呕吐、腹泻、脉搏微弱及呼吸困难，严重可导致死亡。因此，制附子须经长时间的煎煮以降低毒性方可服用。

卫生署提醒市民不应妄自购买中药；如有不适，应先向中医师求诊才服用中药。如在服药后感到不适，应尽快求医。

市民可浏览卫生署中医药事务部网页

([http://cmd.gov.hk/html/b5/health\\_info/pamphlet.html](http://cmd.gov.hk/html/b5/health_info/pamphlet.html))，参阅更多有关安全使用中药信息。

卫生署中医药事务部

2015年10月12日